

Кому прививки проводятся на безвозмездной основе?

Вакцинация против клещевого энцефалита на безвозмездной основе проводится по эпидемическим показаниям в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 № 42 «О профилактических прививках»: *работникам, студентам (обучающимся), выезжающим в составе организованных групп на эндемичные территории (страны), чья профессиональная деятельность связана с лесозаготовительными и другими работами, при которых возможен риск заражения клещевым энцефалитом, в том числе на территориях с показателем заболеваемости выше 0,05 случая на 1000 населения. Также военнослужащим, лицам и работникам МВД, МЧС.*

Какие схемы вакцинации существуют?

Вакцинация против клещевого энцефалита обеспечивает формирование длительного полноценного иммунитета при соблюдении следующих рекомендаций:

прививки выполняются в период отсутствия сезонной активности клещей: первая прививка в октябре-ноябре, вторая через 5-7 месяцев (в марте-апреле);

через год для поддержания сформировавшегося иммунитета проводится поддерживающая прививка (бустер).

В исключительных ситуациях для создания кратковременного иммунитета (быстрого) используются экстренные схемы иммунизации: т.е. интервалы между прививками сокращаются до 1 месяца и менее.

При использовании экстренных схем иммунизации необходимо полностью исключить контакт прививаемого с клещами в период вакцинации и двух недель после него.

Какие вакцины используются против клещевого энцефалита?

- вакцина Энцевир, производство РФ;
- вакцина Клещ-э-Вак, производство РФ;
- вакцина ТикоВак (Тиковак Джуниор), производство Пфайзер (Бельгия).

Целесообразна ли прививка при отдыхе на даче, посещении лесов?

На сегодняшний день нецелесообразно делать прививку против клещевого энцефалита лицам, которые лето проводят на даче под Минском, часто выезжают в лес за грибами, на отдых, т.к. территория Минской области (за исключением Березинского биосферного заповедника) не является территорией, на которой активно циркулирует возбудитель или массово регистрируются случаи клещевого энцефалита.